

İmal Tarihi: (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi: (Ay ve yıl olarak)  
Şarj numarası : (damga)  
Ruhsatname tarihi ve numarası: 03.02.2016/10529

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR:

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu ve Dönemi
Bezelye	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Çobançantası ( <i>Capsella bursa-pastoris</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Hakiki şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> ) Ballibaba ( <i>Lamium amplexicaule</i> ) Çobandeğneği ( <i>Polygonum aviculare</i> )- Yapışkan otu ( <i>Setaria verticillata</i> ) Kuş otu ( <i>Stellaria media</i> ) İsırgan otu ( <i>Urtica urens</i> ) Yavşan otu ( <i>Veronica spp.</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Fasulye	Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Çoban değneği ( <i>Polygonum aviculare</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> ) Hakiki şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> , <i>F. cilicica</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Yapışkan otu ( <i>Setaria verticillata</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum nigrum</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> )	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Soya	Kırmızı köklü tilkikuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> ) Sütleğen ( <i>Euphorbia heterophylla</i> ) Yapışkan otu ( <i>Setaria verticillata</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> )	125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Yonca	Küsküt ( <i>Cuscuta spp.</i> )	125 ml/da Yoncanın 10-12 yapraklı döneminde uygulanır.
Yer fıstığı	Yapışkan otu ( <i>Setaria verticillata</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>E. colonum</i> ) Hakiki şahtere ( <i>Fumaria officinalis</i> )	100 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
	Çukurova fener otu ( <i>Physalis angulata</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> ) Çoban değneği ( <i>Polygonum aviculare</i> )	125 ml/da Erken çıkış sonrası uygulanır.
Ayçiçeği (İMİ toleranslı ayçiçeği çeşitleri)	Yabani hardal ( <i>Sinapis arvensis</i> )	100 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem-ayçiçeği 4-10 yapraklı döneminde uygulanır.
	Horoz ibiği ( <i>Amaranthus albus</i> ) Bambul otu ( <i>Chrosophora tinctoria</i> ) Sirken ( <i>Chenopodium urbicum</i> ) Köpek üzümü ( <i>Solanum album</i> ) Domuz pıtrağı ( <i>Xanthium strumarium</i> ) Kısır yabani yulaf ( <i>Avena sterilis</i> ) Şeytan elması ( <i>Datura stramonium</i> ) Zincir pıtrağı ( <i>Xanthium spinosum</i> ) Kırmızı köklü tilki kuyruğu ( <i>Amaranthus retroflexus</i> )	120 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem-ayçiçeği 4-6 yapraklı döneminde uygulanır.
	Sirken ( <i>Chenopodium album</i> ) Demir dikenli ( <i>Tribulus terrestris</i> ) Semiz otu ( <i>Portulaca oleraceae</i> ) Darıcan ( <i>Echinochloa crus-galli</i> ) Canavar otu - Orabaş ( <i>Orobanche cernua</i> )	130 ml/da Yabancı otlar 2-5 yapraklı dönem -ayçiçeği 6-10 yapraklı döneminde uygulanır.



SUNSET KİMYA

# AFOROZ® 40 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu B,2 Herbisit (Yabancı ot ilacı)

40 g/L Imazamox

- Önce etiketi okuyunuz.
- Evde kullanmayınız.
- Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.
- Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara kullanmayınız.
- Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.
- İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için, tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.
- **TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**
- Kullanılan ürünün boş ambalajlarının içine ¼'üne kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi 3 sefer tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

**Göz:** Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

**Cilt:** Temas halinde elbiselerini çıkarın. İlaç değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.

**Yutma:** Derhal doktor çağırınız. Bir bardak su içirin ve boğazının arka tarafına parmakla dokunarak kusturun. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

**Soluma:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunumda güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırın. Derhal doktora başvurulmalıdır.

#### ANTİDÖTÜ VE TEDAVİSİ

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

@SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

**ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ "UZEM" TEL: 114**

01 Şubat 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Net miktarı: (kg veya L)  
Azami perakende satış fiyatı:

#### İÇİNDEKİLER:

Imazamox  
Glikol

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



#### DİKKAT

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H410 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ (P):

P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanın.

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.

P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.

EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

- Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.
- Balıklar için zehirlidir, Yeraltı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.
- Bitki koruma ürününü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz.
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.
- Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız.
- Uygulamalar yağışsız ve sakın günlerde yapılmalıdır.
- Tavsiye edilen dozlarda kullanıldığında kültür bitkilerine fitotoksik değildir.
- Doğrudan güneş ışığından ve sıcaktan koruyunuz.

Dr. Nesrin ÇAKIR ARICAN  
Daire Başkanı V.

8



Rev.1

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlanmaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Dekara kullanılacak su miktarı 20-40 litre olmalı, uygulamalarda yelpaze huzmeli meme kullanılmalıdır. Hazırlanan karışım aynı gün içinde kullanılmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde, rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır.

### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Dekara kullanılacak su miktarını tespit etmek için ilaçlama makinesinin deposu su ile doldurulur. Bu su ile ne kadar alanın ıslatıldığı belirlenir ve uygulamada kullanılacak su miktarı hesaplanır.

### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

AFOROZ® 40 SL yabancı otların sap ve yapraklarından kolaylıkla emilir ve bitkinin her tarafına taşınır. Yabancı otların gelişmesini engeller ve 3-4 hafta içerisinde ölümlere neden olur.

**IMI Toleranslı Ayçiçeği Çeşitleri:** AFOROZ® 40 SL IMI toleranslı ayçiçeği çeşitlerinde kullanılır. Sezon içerisinde tek uygulama önerilir. İyi sonuç almak için tarladaki hakim yabancı ot türleri iyi tespit edilmeli ve dikkate alınmalıdır. Uygulamada hedef Canavar otu (Orabans) ise ayçiçeğinin 6-10 yapraklı döneminde olması en uygun zamandır.

### MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

AFOROZ® 40 SL uygulamasından sonra ekilecek bitkiler;

Hemen: Fasulye, bezelye, soya, yer fıstığı

4 ay sonra: Arpa, buğday, çavdar, yulaf, darı, nohut, ayçiçeği, tütün

9 ay sonra: Mısır, patates, çeltik, pamuk


12 ay sonra: Kolza, şeker pancarı ve diğer bitkiler

### DİRENÇ YÖNETİMİ:

AFOROZ® 40 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup B,2 olarak sınıflandırılmış bir herbisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için AFOROZ® 40 SL' nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup B,2 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

### KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılması tavsiye edilmez. Bir karışıma gerek duyuluyorsa ön karışım testi yapılmalıdır.



# AFOROZ® 40 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grubu	B,2	Herbisit (Yabancı ot ilacı)
-------	-----	-----------------------------

40 g/L Imazamox

### DEPOLAMA DURUMU:

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında bir değişiklik olmaz.

### FİRMA BEYANI:

Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile, imalatçılar bitki koruma ürününün kalitesini garanti ederler. İmalatçılar bitki koruma ürününün hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

### RUHSAT SAHİBİ FİRMA:

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ

VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş.

Acidereosb Mah. Toros Cad. No:11

Sarıçam/ADANA

Tel: (0322) 394 51 71

Fax: (0322) 394 51 73

### ÜRETİCİ FİRMA:

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.

No:6 Bor/NİĞDE

Tel: (0 388) 999 16 06

Fax: (0 388) 315 00 89



0.1 Şubat 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



Rev.1