


İmal Tarihi : (Baskı veya damga ile ay ve yıl olarak)  
Son kullanma tarihi. ( " )  
Şarj No: (Damga ile)  
Ruhsat tarihi ve no.su: 04.07.2013/9273



Net Miktarı (kg veya lt)  
Brüt ağırlık (kg)  
Azami perakende satış fiyatı: Baskı

### KULLANILACAĞI BİTKİ VE ZARARLI ORGANİZMALAR

Bitki Adı	Zararlı Organizma Adı	Uygulama Dozu	Son Uygulama İle Hasat Arasındaki Süre
Domates	Sebze fidelerinde çökerten ve kök çürüklüğü ( <i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> , <i>Rhizoctonia spp.</i> )	150 ml/100 l su (3 l/m <sup>2</sup> mahlul)	7 gün
Tütün	Çökerten ( <i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> )	200 ml/100 l su (3 l/m <sup>2</sup> mahlul)	-
Biber (Sera)	Toprak kökenli hastalık etmenleri ( <i>Rhizoctonia solani</i> , <i>Fusarium spp.</i> )	500 ml/da (damla sulama ile)	3 gün
Hıyar	Kabakgillerde solgunluk ve kök çürüklüğü ( <i>Fusarium spp.</i> , <i>Pythium spp.</i> )	300 ml/100 l su (3 l/m <sup>2</sup> mahlul)	7 gün
Muz (Sera)	<i>Fusarium solgunluğu</i> ( <i>Fusarium oxysporum f.sp. cubense</i> )	750 ml/da (damla sulama ile)	-
Çim alanları	Toprak kökenli hastalık etmenleri ( <i>Fusarium spp.</i> , <i>Bipolaris spp.</i> )	400 ml/da	-

## JUKE® 36 SL

Suda Çözünen Konsantre (SL)

Grup	A3,32	Fungisit (Mantar ilacı)
------	-------	-------------------------

360 g/l Hymexazol

Önce etiketi okuyunuz.  
Evde kullanmayınız.  
Çocuklardan, gıda ve hayvan yemlerinden uzak tutunuz.  
Bitki koruma ürününün uygulanması sırasında hiçbir şey yemeyiniz, içmeyiniz. Sigara kullanmayınız.  
Bitki koruma ürünü uygulanmış sahaya 1 gün insan ve hayvan sokmayınız.  
İnsan ve çevre sağlığı üzerine riskleri önlemek için tavsiye edildiği şekilde ve tavsiye edilen dozda kullanınız.  
**TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI KESİNLİKLE YASAKTIR.**  
Kullanılan bitki koruma ürünü boş ambalajının dörtte birine kadar temiz su koyarak iyice çalkalayınız. Çalkalama suyunu ilaçlama tankına boşaltınız. Bu işlemi üç kez tekrarlayınız.

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Genel zehirlenme belirtileri görülebilir.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

**Göz:** Temas halinde 15-20 dakika göz açıkken bol su ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.  
**Cilt:** Temas halinde elbiselerini çıkarın. Bitki koruma ürünü değen vücut kısımlarını bol su ve sabun ile yıkayın. Doktora başvurulmalıdır.  
**Soluma:** Etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Solunumda güçlük çekiyorsa suni teneffüs yaptırın. Derhal doktora başvurulmalıdır.  
**Yutma:** Derhal doktor çağırın. Doktor gözetiminde tüm yutulan miktar çıkana kadar hasta kusturulur. Bilinci kapalı hastaya ağızdan bir şey verilmez ve kusturulmaz.

#### ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

© SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ VE ALT.İML.PAZ.SAN. VE TİC.A.Ş. firmasının tescilli markasıdır.

UZEM (Ulusal Zehir Danışma Merkezi) Tel: 114

Dr. Nevin ÇAKIR AKIÇAN  
Daire Başkanı

#### İÇİNDEKİLER:

Hymexazol  
Alkali solüsyon

#### ZARARLILIK İŞARETLERİ:



#### UYARI KELİMESİ: TEHLİKE

#### ZARARLILIK İFADELERİ (H):

H302 Yutulması halinde zararlıdır.  
H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.  
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.  
H412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

#### ÖNLEM İFADELERİ (P):

P273 Çevreye verilmesinden kaçınınız.  
P280 Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/üzü koruyucu kullanınız.  
P501 İçeriği/kabı ilgili yönetmelikler doğrultusunda bertaraf edin.  
EUH401 İnsan sağlığına ve çevreye yönelik riskleri önlemek için, kullanma talimatlarına uyun.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

- Ağızla zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.  
- Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.  
- Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

#### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kaptaki bir miktar su ile karıştırılır. İlaçlama makinesinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Makinenin karıştırıcısı çalışır durumda iken karışım depoya ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek depo suyla tamamlanır. Uygulama tamamlandıktan sonra karıştırma işlemine devam edilir. Hazırlanan bitki koruma ürünü aynı gün içinde kullanınız.

#### KALİBRASYON:

Uygulama öncesinde ilaçlama makinesinin kalibrasyonu yapılmalıdır. Uygulamalarda iyi bir kaplama sağlayacak şekilde belirli alana verilecek karışım miktarı ayarlanmalıdır. Uygulamalar günün serin saatlerinde rüzgarsız veya az rüzgarlı hava koşullarında yapılmalıdır. **Damla sisteminin kalibrasyonu:** Damlama sisteminin kalibrasyonu için baştan ve sondan 3 meme 10 dakika çalıştırılarak debisi ölçülür. Sapma %10'u geçmemelidir. Dekara verilecek bitki koruma ürünü için gerekli su miktarı belirlenir.

#### İLAÇLAMA MAKİNESİNİN TEMİZLİĞİ:

Uygulamanın tamamlanmasından hemen sonra ilaçlama makinesinin deposunu güvenli bir şekilde boşaltınız. Depoya temiz su doldurduktan sonra karıştırıcıyı ve püskürtme sistemini çalıştırarak tüm parçaların yıkanmasını sağlayınız. Yıkama işlemini su kaynaklarının yakınında yapmayınız. Yıkama suyunu ve atıkları su kaynaklarına boşaltmayınız.

10 Subat 2021

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



REV.1

H. C.

**BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:**

**Süzgeçli kova ile uygulama:** Tohumlar ekildikten hemen sonra m<sup>2</sup>'ye litre karışım (mahlul) gelecek şekilde süzgeçli kova veya ilaçlama makinesi ile toprak yüzeyine uygulama yapılır.

**Biberde damla sulama ile uygulama:** Dekara hesaplanan bitki koruma ürünü miktarı, damla sulama ünitesi 10 dakika çalıştırılarak, damla sulama ile toprağa verilir. 1. uygulama dikimden 1 gün sonra, 2. uygulama birinci uygulamadan 30 gün sonra yapılır.

**Muzda uygulama:** Dikim sonrası dekara 750 ml bitki koruma ürünü uygun bir yöntemle (damla sulama) toprağa verilir. Hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra kimyasal mücadele etkili değildir.

**Çim alanlarında uygulama:** Dikimden sonra dekara 400 ml bitki koruma ürünü gelecek şekilde yeşil aksam uygulaması yapılır.

**DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:**

Juke® 36 SL adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup A3,32 olarak sınıflandırılmış bir fungusittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Juke® 36 SL'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup A3,32 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

**KARIŞABİLİRLİK DURUMU:**

Diğer bitki koruma ürünleri ile karıştırılmadan önce ön karışım testlerinin yapılması önerilir.

**JUKE® 36 SL****Suda Çözünen Konsantre (SL)**

Grup	A3,32	Fungisit (Mantar ilacı)
------	-------	-------------------------

**360 g/l Hymexazol****DEPOLAMA DURUMU:**

Normal (serin ve kuru) şartlarda orijinal ambalajında açılmadan depolandığında 2 yıl süre ile ürünün fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerinde hoşgörü (tolerans) sınırları dışında değişiklik olmaz.

**FİRMA BEYANI:** Orijinal ambalajlarında satılmak kaydı ile imalatçılar ürünlerinin kalitesini garanti ederler. İmalatçılar ürünlerinin hatalı depolanması veya hatalı tatbiki veya tavsiyelere uymadaki eksiklik neticesinde vaki olacak zarar için sorumluluk kabul etmezler.

**RUHSAT SAHİBİ FİRMA:**

SUNSET KİMYA TARIM ÜRÜNLERİ  
VE ALT. İML. PAZ. SAN. VE TİC. A. Ş.  
Acidereosb Mah. Toros Cad. No:11  
Sarıçam/ADANA  
Tel: (0322) 394 51 71  
Fax: (0322) 394 51 73

**ÜRETİCİ FİRMA:**

FERBİS TARIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş.  
Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi 2 B Nolu Yol Cad.  
No:6 Bor/NİĞDE  
Tel: (0 388) 999 16 06  
Fax: (0 388) 315 00 89

**10 Şubat 2021**

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI  
GIDA VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.



REV.1

H.T.